



# Instructies afname vaginorectale wisser

## I. Indicaties

Opsporen van GBS (= Groep B streptokokken)-dragerschap. De staalname gebeurt bij een zwangere tussen de 35ste en 37ste week van de zwangerschap tenzij tijdens de zwangerschap reeds een infectie of kolonisatie met GBS werd vastgesteld.

Deze vaginorectale wisser is uitsluitend geschikt voor de GBS-screening, aangezien het geen representatief genitaal staal is, waardoor het per definitie niet in aanmerking komt voor het opsporen van genitale infecties.

## II. Patiëntvoorbereiding

Niet van toepassing

## III. Benodigheden

Steriele wisser met Lim broth-medium (blauwe stop)

## IV. Staalcollectie

- Met behulp van de wisser wordt eerst het voorste 1/3<sup>de</sup> van de vagina gewist en vervolgens wordt met dezelfde wisser rectaal gewist (tot net voorbij de sfincter).
- Hierbij mag geen speculum gebruikt te worden, aangezien staalname ter hoogte van de cervix geen geschikt staal voor een GBS-screening oplevert.
- Het is immers belangrijk voor de gevoeligheid van de GBS-kweek om een staal te nemen van de lagere vagina evenals van het rectum.

## V. Staalbewaring

Gelieve het staal zo snel mogelijk naar het labo te brengen. In afwachting van het transport kan het staal in de frigo worden bewaard.

Bewaring gedurende maximaal 48 uur bij 4 tot 8°C is toegestaan.

## VI. Referenties

HGR 7721: Preventie van perinatale Groep B Streptokokkeninfecties