

Squamous cell carcin antigen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	µg/L
Bron referentiewaarde:	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	tumormarkers

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 9679-2

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	548553
B-waarde:	700
Prijs:	5.57

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548564
B-waarde:	700
Prijs:	5.57

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	SCC
Medidoc code:	63117P.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/squamous-cell-carcin-antigen?auth=1>