

Tacrolimus

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA- volbloed (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	1 EDTA-tube (2 mL)
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Onmiddellijk verzenden op kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:	
Dalwaarden in vroege post-operatieve periode:	10.0 - 20.0 ng/mL
Dalwaarden na 3 maanden post-transplant:	5.0 - 10.0 ng/mL
Doorbelwaarde:	> 20.0 ng/mL
Eenheden:	ng/mL

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks
Maximum antwoordtijd:	3 dagen
Toestel:	Cobas e411
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Therapeutische monitoring

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	548413
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548424
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 EDTA-tube (2 mL)

Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	3710
Labo verkort nummer:	TACR
Medidoc code:	63103K.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/tacrolimus?auth=1>