

## Groep B Streptokokken screening zwangere

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Lim broth wisser (lichtblauwe stop)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	vaginorectale wisser
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	24 uur
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

Streptococcus agalactiae is een belangrijke verwekker van invasieve infecties bij borelingen. Neonati worden via verticale transmissie gekoloniseerd, meestal na het breken van de vliezen en/of tijdens de passage door het geboortekanaal.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad beveelt een GBS-screening aan door middel van een vaginorectale wisser afgenomen op 35-37 weken zwangerschap voor alle zwangere vrouwen (behalve als de patiënte eerder reeds een kind kreeg met een invasieve GBS-infectie; als de patiënte tijdens de huidige zwangerschap GBS-bacteriurie opliep; of als ze <37 weken zwangerschap bevalt: deze vrouwen moeten altijd profylaxe krijgen).

Zwangeren die positief zijn voor GBS, krijgen tijdens de arbeid antibiotica toegediend.

Wanneer men minstens 4 uur voor de eigenlijke geboorte antibiotica kan starten, kan het risico op de gevreesde early onset disease (neonatale sepsis, 20% mortaliteit ) sterk gereduceerd worden.

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Dagelijks
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 dagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550056 - 550060
----------------------------------	-----------------

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbewaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbewaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	GEN.gbs.rap