

Groep B Streptokokken screening zwangere

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Lim broth wisser (lichtblauwe stop)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	vaginorectale wisser
Minimale hoeveelheid:	
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	24 uur
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Streptococcus agalactiae is een belangrijke verwekker van invasieve infecties bij borelingen. Neonati worden via verticale transmissie gekoloniseerd, meestal na het breken van de vliezen en/of tijdens de passage door het geboortekanaal.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad beveelt een GBS-screening aan door middel van een vaginorectale wisser afgenomen op 35-37 weken zwangerschap voor alle zwangere vrouwen (behalve als de patiënte eerder reeds een kind kreeg met een invasieve GBS-infectie; als de patiënte tijdens de huidige zwangerschap GBS-bacteriurie opliep; of als ze <37 weken zwangerschap bevalt: deze vrouwen moeten altijd profylaxe krijgen).

Zwangeren die positief zijn voor GBS, krijgen tijdens de arbeid antibiotica toegediend.

Wanneer men minstens 4 uur voor de eigenlijke geboorte antibiotica kan starten, kan het risico op de gevreesde early onset disease (neonatale sepsis, 20% mortaliteit) sterk gereduceerd worden.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

RIZIV nomenclatuurnummer:	550056 - 550060
----------------------------------	-----------------

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	GEN.gbs.rap