

Neisseria gonorrhoeae DNA urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Steriele urinetubes
Afname recipient alternatief:	Steriel urinepotje
Staal type:	Eerste portie urine (man)
Minimale hoeveelheid:	10 mL (eerste fractie)
Afname condities:	
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Urine is voor vrouwelijke patiënten een minder aangewezen staal omwille van lagere sensitiviteit; een cervicale wisser geniet de voorkeur!
Bij mannen is het belangrijk de eerste portie van de urine te collecteren (bij voorkeur ochtendurine of minstens 1 uur niet geplast tevoren).

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	weekdagen
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	550911
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550922
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL (eerste fractie)
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	NEIGON.DNA.URI
Medidoc code:	63380G.A

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/neisseria-gonorrhoeae-dna-urine?auth=1>