

Cryptosporidium parvum

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Steriel stoelgangpotje met lepeltje
Afname recipient alternatief:	Steriel recipiënt
Staal type:	Stoelgang
Minimale hoeveelheid:	3 stoelganglepeltjes
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	24 uur
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Infectie met *Cryptosporidium* veroorzaakt acute diarree die in principe zelflimiterend is. De infectie kan eveneens asymptomatisch verlopen. De incubatieperiode bedraagt meestal 7 tot 10 dagen. De diarree kan variëren van zeer intens en waterdun tot matig en intermitterend en gaat vaak gepaard met darmkrampen. De mate van klachten hangt onder andere af van de immuunstatus van de patiënt. Bij immuuncompetente personen verdwijnen de klachten meestal na 2-3 weken, met een maximum van 5 weken, maar bij immuno-incompetenten (o.a. AIDS-patiënten) kunnen ze vele maanden tot zelfs jaren aanhouden.

Cryptosporidium-infecties worden opgelopen via de fecaal-orale route: via direct contact tussen mens en dier, directe overdracht van mens op mens, maar ook indirect door fecaal besmet drinkwater, oppervlaktewater en zwembadwater of via besmet voedsel.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	Tweemaal per week
Maximum antwoordtijd:	3 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	549872
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	549883
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	3 stoelganglepeltjes

Interferentie:

Labo aanvraagnummer:

FEC.cryspp.pos

Labo verkort nummer:

FEC.cryspp

Medidoc code:

13911C_F

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/cryptosporidium-parvum?auth=1>