

## Mycobacterium tuberculosis DNA (urine)

### ▼ Afname condities

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | Steriele urinotubes |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> | Steriel urinepotje  |
| <b>Staal type:</b>                   | Ochtendurine        |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         | 5 mL                |
| <b>Afname condities:</b>             |                     |
| <b>Bewaring:</b>                     | Koelkast            |
| <b>Transport condities:</b>          | gekoeld             |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             |                     |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            | 1 week              |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          |                     |

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

Identificatie van *M. tuberculosis* gebeurt via twee detecties. In een eerste detectie wordt DNA specifiek voor het genus *mycobacterium* opgespoord en in een tweede detectie wordt DNA specifiek voor de *M. tuberculosis* complex groep opgespoord. Enkel wanneer beide reacties positief zijn wordt de kiem geïdentificeerd als *M. tuberculosis*.

Detectie van *M. tuberculosis* via PCR rechtstreeks op respiratoire stalen heeft een beperkte gevoeligheid wanneer het microscopisch onderzoek negatief is voor zuurvaste bacillen. Uit eigen studies blijkt dat de gevoeligheid in die gevallen tot 50% kan dalen. Deze beperkte gevoeligheid is vooral te wijten aan het kleinere startvolume dat wordt gebruikt bij de PCR. Voor stalen met zuurvaste bacillen bij microscopisch onderzoek ligt de gevoeligheid tussen 90 en 97%. Dit betekent in elk geval dat een negatief resultaat tuberculose niet volledig uitsluit. Vals-positieve resultaten daarentegen zijn zeer zeldzaam.

Over de gevoeligheid van PCR op andere dan respiratoire stalen bestaan weinig gegevens. Men mag aannemen dat de gevoeligheid niet groter is dan voor respiratoire stalen.

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | UZ Leuven                   |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> | Prof. Dr. M. Van Ranst      |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  | tweemaal per week (ma & do) |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                | 1 week                      |
| <b>Toestel:</b>                             |                             |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no                          |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              |                             |

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 550933 |
| <b>B-waarde:</b>                 | 2000   |
| <b>Prijs:</b>                    | 15.92  |

#### ▼ Tarief vrijblijvend

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 550944 |
| <b>B-waarde:</b>                 | 2000   |
| <b>Prijs:</b>                    | 15.92  |

### ▼ Analysegegevens

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Doorbelwaarde ondergrens:</b> |                    |
| <b>Doorbelwaarde bovengrens:</b> |                    |
| <b>Minimum volume test:</b>      | 5 mL               |
| <b>Interferentie:</b>            |                    |
| <b>Labo aanvraagnummer:</b>      | MYCTUB.dna.kwl.URI |
| <b>Labo verkort nummer:</b>      | MYCTUB.dna.kwl.URI |

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/mycobacterium-tuberculosis-dna-urine?auth=1>