

## Voriconazole dalspiegel

### ▼ Afname condities

**Afname recipient voorkeur:** Heparine plasma (in tube zonder gel)

**Afname recipient alternatief:**

**Staal type:** plasma

**Minimale hoeveelheid:** 1 mL

**Afname condities:**

De eerste dalspiegel wordt best afgenomen na 4 dagen therapie (steady state) en dit net vóór de volgende toediening.

**Bewaring:** kamertemperatuur

**Transport condities:** kamertemperatuur

**Stabiliteit (KT):**

**Stabiliteit (4°C):**

**Stabiliteit (-20°C):**

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

Voor dosisadvies zijn volgende gegevens noodzakelijk: dosisschema, laatste toediening, laatste maaltijd, concomitante therapie

### ▼ Uitvoeringsinformatie

**Uitvoerend labo:** UZ Leuven

**Verantwoordelijke klinische bioloog:** Prof. Dr. M. Van Ranst

**Uitvoerfrequenties:**

2x /week

**Maximum antwoordtijd:**

**Toestel:**

**Test onder accreditatie:** no

**Type aanvraagformulier:**

### ▼ Analysegegevens

**Doorbelwaarde ondergrens:**

**Doorbelwaarde bovengrens:**

**Minimum volume test:** 1 mL

**Interferentie:**

**Labo verkort nummer:** VORICON.dal