



## aanvraagformulier specifiek voor het bepalen van een therapeutische monitoring antibiotica

### Patiënt gegevens: verplicht voor RIZIV

Naam: .....  
Voornaam: .....  
Geboortedatum: .....  
Naam partner: .....  
Dossiernummer patiënt: .....  
Geslacht: .....

Vignet Patiënt

**KLEEF HIER VIGNET**

### ALGEMENE INSTRUCTIES BIJ AFNAME

**test kan slechts worden bepaald op aanvraag van een arts**

- Minimum 2 doseringen zijn vereist voor RIZIV-terugbetaling van dosage aminoglycosiden.
- Exacte tijdstip bloedafname noteren op de afnametube.
- Stalen duidelijk merken als dal of piek op de bloedafnametube.
- Bloedafname niet langs de kant van het infuus.
- Medicatie gegevens achterzijde formulier volledig en correct invullen!

#### voorschrijvende geneesheer

naam (stempel) \_\_\_\_\_  
riziv-nummer \_\_\_\_\_  
aanvraag datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### duplicaat

duplicaat voor Dr. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

handtekening

# antibiotica therapeutische monitoring - dossieradvies

datum uitgevoerde analyse :

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_

## STAALAFNAME

**Antibioticum**  Amikacine  Gentamycine  
eerste dosis  ja  neen

### Afnametijdstip

dal: ..... uur ..... min

piek: ..... uur ..... min

**Antibioticum**  Vancomycine  
eerste dosis  ja  neen

### Afnametijdstip

dal: ..... uur ..... min

piek: ..... uur ..... min

continu infuus (serumspiegel wordt bepaald, maar er wordt geen dosisadvies gegeven)

## In te vullen therapiegegevens en patiëntgegevens

Datum HUIDIGE toediening	..... / ..... / .....
Uur HUIDIGE toediening (start IV)	..... uur ..... min
Perfusieduur	..... min
HUIDIGE dosis / dosisinterval	..... mg / ..... uur

Datum VORIGE toediening	..... / ..... / .....
Uur VORIGE toediening	..... uur ..... min
VORIGE dosis / dosisinterval	..... mg / ..... uur

Lichaamsgewicht	..... kg
Lichaamslengte	..... cm

## INSTRUCTIES BIJ AFNAME

### Vancomycine

- Dal bepaling: afname juist vóór de volgende toediening
- Piek bepaling: 1 uur na start van een IV infuus over 30 minuten
- Piek bepaling: bij Continu infuus dan eerste spiegel bepaling na 48 uur

### Gentamycine - amikacine

- Dal bepaling: afname juist vóór de volgende toediening
- Piek bepaling: 1 uur na start van een IV infuus over 30 minuten